

Prevención de infecciones después de la operación

A veces, puede haber infecciones después de la operación. Antes de la operación, le harán una prueba para ver si tiene más posibilidades de tener una infección por estafilococos.

¿Qué es una infección por estafilococos?

El *Staphylococcus aureus* o "estafilococo áureo" es una bacteria muy frecuente. Aproximadamente 1 de cada 3 personas tiene estafilococos en la piel o en la nariz. Por lo general, no le causa ningún problema a la mayoría de las personas que los tienen en la piel. A veces, puede causar problemas graves, como neumonía o infección en la sangre, la piel o una herida.

Tipos de infecciones por estafilococos

Hay dos tipos diferentes de infecciones por estafilococos llamadas MRSA y MSSA.

Prueba de detección de estafilococos

Antes de la operación, deberá hacerse una prueba para detectar MRSA y MSSA. Esto se hace con el hisopado nasal en un laboratorio. Si el resultado de la prueba es positivo para MRSA o MSSA, deberá usar un ungüento nasal durante cinco días antes de la operación.

Cómo usar el ungüento nasal

Recibirá una receta de su cirujano para un ungüento llamado Mupirocin. El ungüento viene en un tubo. **Aplique el ungüento dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche, durante 5 días antes de la operación.** Si comienza menos de 5 días antes de la operación, siga usando el ungüento después de la operación para completar los 5 días.

Para usarlo:

- Lávese las manos.
- Ponga el ungüento en la parte de enfrente de ambas fosas nasales con un hisopo de algodón limpio (Q-tip®).
- Presione los lados de las fosas nasales y júntelas varias veces para esparcir el medicamento. Lávese las manos cuando termine.
- Deje de usarlo y llame a su cirujano si tiene inflamación, enrojecimiento o irritación.



Recuerde lavarse las manos con frecuencia, ¡especialmente después de la operación!